

彰化縣衛生局統計通報

中華民國 103 年 10 月會計室發布

網址：http://www.chshb.gov.tw/download/?type_id=1279&top=0

102 年彰化縣死因統計之惡性腫瘤概況

- 102 年彰化縣死亡原因屬惡性腫瘤人數總計 2,624 人，較 101 年減少 14 人；在惡性腫瘤死亡原因中以氣管、支氣管和肺癌 542 人占 20.7% 最多，肝和肝內膽管癌 476 人占 18.1% 次之；若與 101 年比較，氣管、支氣管和肺癌所占人數減少 17 人，肝和肝內膽管癌所占比率也減少 40 人。
- 以彰化縣三大地方生活圈區分死亡原因屬惡性腫瘤人數，北彰化(彰化市等 9 個鄉鎮市)為 1,079 人、南彰化(員林鎮等 13 個鄉鎮市)為 1,163 人、西南地區(芳苑鄉等 4 個鄉鎮市)則為 382 人；與 101 年比較三大區域中以北彰化人數變動幅度最大(減少 47 人)。
- 102 屬惡性腫瘤死亡人數為 2,624 人，其中男性 1,711 人占 65.21%，為女性(913 人)1.87 倍，按年齡別區分則以 70 至未滿 80 歲 737 人(占 28.09%) 最多；與 101 年比較，50 至未滿 60 歲組別變動幅度最大(減少 54 人)。

102 年本縣十大死因以慢性病為主，其中惡性腫瘤近 5 年高居彰化縣縣民死因首位，占率高於排名第 2 之心臟疾病 1 倍以上。惡性腫瘤(又名癌症)是人體內一些突變細胞不正常的增殖，因癌細胞繁殖速度相當快，且具有高度侵犯性及轉移性，造成人體器官的病變引發各種不適症狀，最後導致器官功能喪失並危及生命。惡性腫瘤的成因一直是科學家多年來研究的問題，據目前研究所知，除了家族性的遺傳外，環境的污染、不當的飲食習慣及生活中的過度壓力等，都和惡性腫瘤的發生有著密切的關係，在了解這些可能造成惡性腫瘤的成因後，我們應該適度的調整生活習慣、避免環境的污染，以遠離癌症對我們的威脅。茲就 102 年彰化縣死亡原因屬惡性腫瘤之簡析如下：

- 一、 死亡原因：102 年彰化縣死亡原因屬惡性腫瘤人數總計 2,624 人，較 101 年減少 14 人；在惡性腫瘤死亡原因中以氣管、支氣管和肺癌 542 人占 20.7% 最多，肝和肝內膽管癌 476 人占 18.1% 次之，結腸、直腸和肛門癌 294 人占 11.2% 居第三；若與 101 年比較，前三大主要死亡原因順序未變，氣管、支氣管和肺癌所占人數減少 17 人，而肝和肝內膽管癌所占人數也減少 40 人，但結腸、直腸和肛門癌則增加 3 人。

二、 通報地域：以彰化縣三大地方生活圈區分，102 年惡性腫瘤死亡人數北彰化(彰化市等 9 個鄉鎮市)為 1,079 人、南彰化(員林鎮等 13 個鄉鎮市)為 1,163 人、西南地區(芳苑鄉等 4 個鄉鎮市)則為 382 人；與 101 年比較三大區域中以北彰化人數變動幅度最大(減少 47 人)，又以彰化市減少 68 人變動最多。

三、 依類型分別

(一)、 按性別分：102 死亡原因屬惡性腫瘤人數計 2,624 人，其中男性 1,711 人(占 65.21%)，女性 913 人(占 34.79%)，男性死亡人數為女性 1.87 倍；而男性前三大惡性腫瘤死亡原因分別為氣管、支氣管和肺癌(382 人)、肝和肝內膽管癌(314 人)及口腔癌(232 人)，女性前三大原因則為氣管、支氣管和肺癌(162 人)、肝和肝內膽管癌(160)及結腸、直腸和肛門癌(141 人)。

(二)、 按年齡層分：102 屬惡性腫瘤死亡人數為 2,624 人，以 70 至未滿 80 歲 737 人占 20.09%最多，80 至未滿 90 歲者 595 人占 22.68%次之；各年齡組別中以 50 至未滿 60 歲之組別較 101 年減少 54 人變動幅度最多。


表一、彰化縣惡性腫瘤死亡人數按腫瘤類型區分

單位：人

年別	總計	氣管、支氣 管和肺癌	肝和肝內 膽管癌	結腸、直腸 和肛門癌	其他
民國 98 年	2,507	539	483	263	1,222
民國 99 年	2,610	564	471	297	1,278
民國 100 年	2,632	595	485	269	1,283
民國 101 年	2,638	559	516	291	1,272
民國 102 年	2,624	542	476	294	1,312
與 101 年比 較增(減)數	-14	-17	-40	3	40

資料來源：衛生福利部統計處

圖一、彰化縣惡性腫瘤死亡人數按腫瘤類型區分
民國 102 年



資料來源：衛生福利部統計處

表二、彰化縣惡性腫瘤死亡人數按生活圈與鄉鎮市區分


單位：人

生活圈與鄉鎮市		101 年	102 年	較 101 年增減數
總計		2,638	2,624	-14
北彰化	彰化市	429	361	-68
	伸港鄉	59	63	4
	線西鄉	33	39	6
	和美鎮	139	155	16
	鹿港鎮	149	154	5
	福興鄉	107	81	-26
	秀水鄉	76	75	-1
	花壇鄉	79	86	7
	芬園鄉	55	65	10
小計		1,126	1,079	-47
南彰化	員林鎮	197	201	4
	埔鹽鄉	84	91	7
	大村鄉	85	47	-38
	溪湖鎮	103	130	27
	埔心鄉	68	89	21
	田尾鄉	73	56	-17
	永靖鄉	96	89	-7

	社頭鄉	87	92	5
	埤頭鄉	83	78	-5
	北斗鎮	67	67	0
	田中鎮	93	94	1
	溪州鄉	69	90	21
	二水鄉	46	39	-7
	小計	1,151	1,163	12
西南地區	芳苑鄉	104	110	6
	大城鄉	63	60	-3
	二林鄉	144	150	6
	竹塘鄉	50	62	12
	小計	361	382	21

資料來源：衛生福利部統計處

圖二、彰化縣惡性腫瘤死亡人數按生活圈與鄉鎮市區分



資料來源：衛生福利部統計處

表三、彰化縣惡性腫瘤死亡人數按年齡別及性別區分


單位：人

年齡別	101 年		102 年		較 101 年增減數
	人數	結構比(%)	人數	結構比(%)	人數
總計	2,638	100	2,624	100	-14
0-未滿 30 歲	20	0.76	25	0.95	5
30-未滿 40 歲	75	2.84	44	1.68	-31
40-未滿 50 歲	212	8.04	188	7.16	-24
50-未滿 60 歲	460	17.44	406	15.47	-54
60-未滿 70 歲	504	19.11	539	20.54	35
70-未滿 80 歲	738	27.98	737	28.09	-1
80-未滿 90 歲	548	20.77	595	22.68	47
90 歲以上	81	3.07	90	3.43	9
男性	1,723	65.31	1,711	65.21	-12
女性	915	34.69	913	34.79	-2
性別比(男/女)	1.88 倍		1.87 倍		-0.01 倍

資料來源：衛生福利部統計處

圖三、彰化縣惡性腫瘤死亡人數按年齡別及性別區分

民國 102 年



資料來源：衛生福利部統計處