附錄

疫苗接種前14天內曾有SARS-CoV-2暴露風險之醫療照護工作人員接種COVID-19疫苗後出現不良反應之處置建議（範例）

依出現的症狀、發生的時間與持續情形評估	症狀類別	症狀
	與COVID-19感染無關之接種疫苗後症狀	蕁麻疹或嚴重過敏等立即性過敏反應、注射部位紅腫痛等
	疑似血栓合併血小板低下之症狀	呼吸困難、胸痛、腿部腫脹、持續腹痛、神經學症狀（包含嚴重和持續性頭痛、視力模糊等）、非注射部位出現不尋常出血點等
	與COVID-19感染及疫苗接種有關之症狀	發燒、頭痛、疲倦、肌肉痛、關節痛等
	與COVID-19感染有關但與疫苗接種無關之症狀	咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常、腹瀉等

情境	建議
 	個案無其他任何與COVID-19感染有關之症狀 依**疫苗不良反應因應原則**處理
  	個案無發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等COVID-19疑似症狀 建議**就醫評估是否進行採檢及是否可繼續工作**
  	**暫停工作**，依「**醫療照護工作人員擴大採檢及個案處理流程**」評估採檢

疫苗接種前14天內無有SARS-CoV-2暴露風險之醫療照護工作人員
接種COVID-19疫苗後出現不良反應之處置建議（範例）

依出現的症狀、發生的時間與持續情形評估	症狀類別	症狀
	與COVID-19感染無關之接種疫苗後症狀	蕁麻疹或嚴重過敏等立即性過敏反應、注射部位紅腫痛等
	疑似血栓合併血小板低下之症狀	呼吸困難、胸痛、腿部腫脹、持續腹痛、神經學症狀（包含嚴重和持續性頭痛、視力模糊等）、非注射部位出現不尋常出血點等
	與COVID-19感染及疫苗接種有關之症狀	發燒、頭痛、疲倦、肌肉痛、關節痛等
	與COVID-19感染有關但與疫苗接種無關之症狀	咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常、腹瀉等

情境	建議
	個案無其他任何與COVID-19感染有關之症狀 依**疫苗不良反應因應原則**處理
	
	**仍可工作，可視情況考慮就醫評估**是否進行採檢
	建議**就醫評估**是否進行採檢及是否可繼續工作
	**原則上無須採檢**，於**退燒24小時且相關症狀緩解後可返回醫院上班**；但如**經評估有採檢需要者**，仍應依「**醫療照護工作人員擴大採檢及個案處理流程**」
	**暫停工作**，依「**醫療照護工作人員擴大採檢及個案處理流程**」評估採檢