



## Pfizer-BioNTech(BNT)疫苗「兒童劑型」及「青少年/成人劑型」之 外觀/劑量/使用比較表

111.05.18 版

劑型/適用年齡	兒童劑型 $\geq 5 \sim < 12$ 歲	青少年/成人劑型 $\geq 12$ 歲	說 明
外盒包裝	10 瓶/盒  	49 瓶/盒  	• 未使用前置於原包裝盒內避光冷儲
外觀			
瓶蓋	橘蓋橘標框英文標示 (商品名 Comirnaty)	紫蓋中/英文標示	
稀釋前	1.3ml  	0.45 ml  	
每瓶稀釋量	1.3ml	1.8ml	稀釋液: 0.9% 生理食鹽水注射液
劑型(稀釋後)	10 劑/瓶  	6 劑/瓶  	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 橘蓋稀釋後幾乎滿瓶</li> <li>➤ 紫蓋稀釋後約 2/3 瓶量，有點白濁</li> </ul>
每劑含量	10mcg	30mcg	
每劑接種劑量	0.2ml	0.3ml	

劑型適用年齡	兒童劑型 ≥ 5~<12 歲	青少年/成人劑型 ≥ 12 歲	說 明
接種時程	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>基礎劑 2 劑 · 兩劑間隔 12 週</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>基礎劑 2 劑 · 兩劑間隔 12 週(12-17 歲)</b></li> <li>➤ <b>追加劑 1 劑 · 與最後一劑基礎劑間隔至少 5 個月</b></li> </ul>	<p>※EUA 核准基礎劑 2 劑 · 兩劑接種間隔至少 21 天；≥18 歲間隔至少 3 個月追加第 1 劑 · 風險族群再間隔 5 個月可追加第 2 劑</p>
冷儲條件 /效期	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -90~-60°C 冷凍儲存 9 個月,如外盒/瓶身標示效期</li> <li>➤ 解凍未開瓶在效期前 <b>2-8°C</b> 可冷儲 <b>10 週</b></li> <li>※(詳見盒裝標籤標示使用期限)</li> <li>➤ 未開瓶安定性 <ul style="list-style-type: none"> <li>• -2°C~2°C : 10 週</li> <li>• 8°C~30°C : 12 小時</li> </ul> </li> <li>➤ <b>稀釋後 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2°C~30°C 下 12 小時內使用完畢</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 90~-60°C 冷凍儲存 9 個月,如外盒/瓶身標示效期</li> <li>➤ 解凍未開瓶在效期前 <b>2-8°C</b> 可冷儲 <b>1 個月</b></li> <li>※(詳見盒裝標籤標示使用期限)</li> <li>➤ 未開瓶安定性 <ul style="list-style-type: none"> <li>• -3 °C~2 °C : 24 小時</li> <li>• 8°C~30°C : 4 小時；30 °C : 2 小時</li> </ul> </li> <li>➤ <b>稀釋後 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2°C~30°C 下 6 小時內使用完畢</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>避光儲存 · 解凍後不能再冷凍</b></li> <li>• 稀釋前應檢查小瓶內液體是<b>白色</b>到<b>灰白色</b></li> <li>• 稀釋後的液體<b>如有顆粒或變色</b>，<b>不能使用</b></li> <li>• 疫苗原廠效期<b>可能採「月/日/年」或「日/月/年」</b>標示，以疾病管制署下貨之 Email 通知及 NIIS 所載批號效期為準，如有疑問請洽轄區衛生局/所</li> </ul>
稀釋前/後			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稀釋前/後各輕輕上下倒置疫苗瓶 10 次混合均勻</li> <li>➤ <b>不要搖晃</b></li> </ul>