

Taiwan V-Watch 症狀統計 成人基礎劑

資料截至 December 12, 2021

公告日期 December 22, 2021

疾病管制署



TAIWAN CDC

Taiwan V-Watch


- Taiwan V-Watch為「疾管家」新建立之COVID-19疫苗接種後健康回報系統。主動監測國人接種緊急使用授權之不同廠牌疫苗常見的不良反應，或可能發生的不良事件
- **成人V-Watch**：成人接種基礎劑/追加劑且於現場掃描QR code之V-Watch註冊者，各廠牌COVID-19疫苗收前3萬名為主動追蹤對象
- **兒童與青少年V-Watch**：2022年5月3日開啟，經由父母或監護人關切未成年子女接種後狀況，並透過手機代為填寫健康回報。以各廠牌前6萬名註冊者為主動追蹤對象。加入方式請參考
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA
- 藉由完整填寫健康回報，除了讓個人自我觀察接種不適狀況是否逐漸改善外，也讓國人瞭解常見不適症狀發生概況並於接種前就預知可能發生的症狀。也能因此提醒接種者若有身體不適請及時就醫評估
- 不論是否加入V-Watch，當接種者發生疑似接種後嚴重不良事件，**皆需藉由醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」**，啟動後續關懷與追蹤

疾病管制署



TAIWAN CDC

V-Watch 主動追蹤人數統計



疾病管制署



TAIWAN CDC

接種後七日內常見症狀


接種後第一天(D1)、第二天(D2)、第三天(D3)、第四天(D4)、
第五天(D5)、第六天(D6)與第七天(D7)

疾病管制署




TAIWAN CDC

AZ




Moderna



高端

每日回報比例前十症狀(高端第一劑)

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7




接種後第一天(D1)發燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) :

- 高端第一劑為0.9%
- 高端第二劑為0.8%

每日回報比例前十症狀(高端第二劑)

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7




疾病管制署 TAIWAN CDC

BNT

每日回報比例前十症狀(BNT第一劑)

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7




接種後第一天(D1)發燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) :

- BNT第一劑為1.9%
- BNT第二劑為4.5%

每日回報比例前十症狀(BNT第二劑)

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7




疾病管制署 TAIWAN CDC

第二劑接種BNT (AZ+BNT)

每日回報比前次症狀(AZ第一劑BNT第二劑)

● D1 ● D2 ● D3 ● D4 ● D5 ● D6 ● D7



第二劑接種後不適 (%)	疲倦	肌肉酸痛	頭痛	發燒	注射部位疼痛	注射部位腫脹
AZ+BNT	38.2 (D1) → 5.5 (D7)	29.4 (D1) → 2.2 (D7)	24.2 (D1) → 3.2 (D7)	7.0 (D1) → 0.5 (D7)	73.7 (D1) → 3.0 (D7)	29.6 (D1) → 1.4 (D7)
AZ+AZ	24.5 (D1) → 3.9 (D7)	13.8 (D1) → 1.3 (D7)	11.8 (D1) → 2.0 (D7)	3.0 (D1) → 0.2 (D7)	42.0 (D1) → 1.7 (D7)	17.7 (D1) → 0.8 (D7)
BNT+BNT	30.4 (D1) → 7.1 (D7)	22.5 (D1) → 2.7 (D7)	19.9 (D1) → 3.7 (D7)	4.5 (D1) → 0.3 (D7)	62.6 (D1) → 3.5 (D7)	28.1 (D1) → 2.2 (D7)

疾病管制署



TAIWAN CDC

9

第二劑接種Moderna (AZ+Moderna)

每日回報比前次症狀(AZ第一劑Moderna第二劑)

● D1 ● D2 ● D3 ● D4 ● D5 ● D6 ● D7



第二劑接種後不適 (%)	疲倦	肌肉酸痛	頭痛	發燒	注射部位疼痛	注射部位腫脹
AZ+Moderna	50.7 (D1) → 5.1 (D7)	46.3 (D1) → 2.0 (D7)	39.2 (D1) → 3.7 (D7)	24.0 (D1) → 0.4 (D7)	81.9 (D1) → 3.4 (D7)	41.0 (D1) → 2.0 (D7)
AZ+AZ	24.5 (D1) → 3.9 (D7)	13.8 (D1) → 1.3 (D7)	11.8 (D1) → 2.0 (D7)	3.0 (D1) → 0.2 (D7)	42.0 (D1) → 1.7 (D7)	17.7 (D1) → 0.8 (D7)
Moderna+Moderna	65.7 (D1) → 8.3 (D7)	56.6 (D1) → 3.0 (D7)	49.2 (D1) → 5.4 (D7)	37.1 (D1) → 0.4 (D7)	83.2 (D1) → 3.9 (D7)	55.5 (D1) → 2.8 (D7)

疾病管制署



TAIWAN CDC

10

七日內常見症狀

- ❖ 第一劑與第二劑**接種後七日內症狀均趨向緩解**，前兩日之全身性症狀以**疲倦、肌肉酸痛、頭痛**常見(7%~68%)；局部不適以**注射部位疼痛**及**注射部位腫脹**常見(8%~83%)
- ❖ 第二劑為混打接種者，前兩日之全身性症狀以疲倦、肌肉酸痛、頭痛常見(22%~51%)；局部不適以注射部位疼痛及注射部位腫脹常見(25%~82%)

國內COVID-19疫苗安全性參考資訊連結

1. COVID-19疫苗不良事件通報摘要
<https://www.fda.gov.tw/TC/SITELIST.ASPX?SID=1571>
2. COVID-19疫苗統計資料
<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/9jFXNbCe-sFK9ElmRRi2Og>
3. 台灣COVID-19疫苗接種後不良事件通報
<https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGfKng>
4. Taiwan V-Watch COVID-19疫苗接種-健康回報
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA

Thank you!

