

# 醫療照護工作人員 COVID-19 疫苗接種後處置建議

衛生福利部疾病管制署

110 年 3 月 17 日訂定

111 年 10 月 13 日修訂

## 壹、目的

COVID-19 疫苗接種為降低 SARS-CoV-2 感染及其傳播的重要方法之一，惟疫苗接種後出現之部分不良反應可能難以與 COVID-19 感染或其他感染性疾病的症狀區分，因此疫苗接種後出現不良反應的醫療照護工作人員可能會被誤認為罹患傳染性疾病，而被建議暫停工作，或實為罹患傳染性疾病但被誤認為疫苗接種後之不良反應而持續出勤，這些狀況均可能會對醫療照護機構的工作人員、病人和服務對象等造成負面影響；因此，須有效監測與管理醫療照護工作人員接種疫苗後出現之反應，採取適當措施，以避免不必要之工作限制並預防傳染性疾病之傳播。本建議提供醫療照護機構參考內化，以保護醫療照護機構工作人員、病人和服務對象等之健康，未來將依疫情發展狀況，視需要持續更新修訂本建議。

## 貳、疫苗接種後不良反應概述

接種 COVID-19 疫苗後，可能會出現不良反應，例如：注射部位疼痛或紅腫、疲倦、頭痛、畏寒、肌肉痛、關節痛和發燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )等。依據 WHO 公布之疫苗臨床試驗的初步資料顯示，疫苗接種後出現不良反應的嚴重度大多數為輕度至中度，年輕族群發生疫苗不良反應的比率高於年長者，mRNA 疫苗（如：Pfizer-BioNTech、Moderna）於接種第 2 劑後較常出現不良反應，腺病毒載體疫苗(如：AstraZeneca 疫苗)

則為接種第 1 劑後較常出現不良反應；疫苗不良反應通常在接種後 2 天內出現（以接種當天為第 0 天，大部分出現在第 1 天），並於出現後 1-2 天消退。接種 COVID-19 疫苗後可能會出現的不良反應因疫苗廠牌而異，詳細資訊請參考衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19 疫苗」專區。

若接種疫苗後出現咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常、腹瀉等症狀，一般而言與疫苗接種無關，需進一步評估是否為 COVID-19 或其他感染所造成。

## 參、疫苗接種作業前之準備

一、醫療照護機構應訂定機構內 COVID-19 疫苗接種計畫，包含成立疫苗接種工作小組、接種優先順序（如：專責病房及依照護風險分列優先順序等）、預約接種、接種場地(含注射區及休息區)與動線、提升接種意願之配套措施、相關衛教宣導及關懷機制等規劃；並建立掌握機構內醫療照護工作人員之接種狀態、不良反應情形及其追蹤管理機制，即時評估醫療照護工作人員接種疫苗後不良反應，包含必要時提供 SARS-CoV-2 病毒檢驗。

二、建議醫療照護工作人員安排於例假日前或休假前接種疫苗，以利適時休養。

三、考量人力調度，建議錯開機構中醫療照護工作人員的疫苗接種期程，避免同一專科、或單位中的所有醫療照護工作人員同時接種疫苗，尤其是在接種疫苗不良反應發生率較高之劑次時（mRNA 疫苗為第 2 劑、AstraZeneca 疫苗為第 1 劑），更加重要。

四、告知醫療照護工作人員接種後可能短暫出現的不良反應，如輕微發燒可多喝水休息，局部出現紅腫及疼痛部位勿揉搓或抓，可局部

適度冰敷部位並觀察等，以及出現時可選擇使用的緩解藥物。

五、訂定支持性的給假政策，以確保醫療照護工作人員在接種疫苗後出現不良反應時通報之意願。

#### 肆、評估和管理醫療照護工作人員接種 COVID-19 疫苗後不良反應之建議

醫療照護工作人員於接種疫苗後，若僅出現與 COVID-19 感染無關之施打疫苗後症狀（如：蕁麻疹或嚴重過敏等立即性過敏反應、注射部位紅腫痛等），或疑似血栓合併血小板低下之症狀，包含呼吸困難、胸痛、腿部腫脹、持續腹痛、神經學症狀（包含嚴重和持續性頭痛、視力模糊等）、非注射部位出現不尋常出血點等症狀，應依疫苗不良反應因應原則處理，當出現立即性過敏反應、疑似血栓合併血小板低下、較為嚴重之不良反應或症狀持續未改善者，應儘速就醫診治。

若醫療照護工作人員於疫苗接種前 14 天內，在社區或機構內曾有暴露於 SARS-CoV-2 風險，如：正在收治確診個案之單位的人員、14 天內曾照顧或接觸確診個案之人員等，若於接種疫苗後出現 COVID-19 疑似症狀（如：發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等），應立即暫停工作，並就醫評估採檢；若出現頭痛、疲倦、肌肉痛、關節痛等症狀，但無發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等 COVID-19 疑似症狀，建議就醫評估是否進行採檢及是否可繼續工作。

若醫療照護工作人員於疫苗接種前 14 天內，在社區或機構內無 SARS-CoV-2 暴露風險，則依其疫苗接種後出現的症狀與癥候、發生的時間與持續情形，分別建議如下：

一、接種疫苗後出現與 COVID-19 感染有關但與疫苗接種無關之症狀（如：咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常、腹瀉等）：建議暫停工作，就醫評估採檢，並依檢驗結果採取適當防疫措施。

## 二、接種疫苗後出現與 COVID-19 感染及疫苗接種有關之症狀：

(一) 出現發燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )：建議暫停工作。

1. 接種 2 天以後（以接種日為第 0 天）發燒或發燒持續超過 2 天以上：

就醫評估採檢，並依檢驗結果採取適當防疫措施。

2. 接種 2 天內發燒且未持續超過 2 天：

原則上無須採檢，於退燒 24 小時且相關症狀緩解後可返回醫院上班；可視情況考慮就醫評估是否進行採檢。

(二) 出現頭痛、疲倦、肌肉痛、關節痛等症狀，但無發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等 COVID-19 疑似症狀：

1. 仍可工作，可視情況考慮就醫評估是否進行採檢。
2. 如該等症狀出現於接種 2 天以後或接種後症狀持續超過 2 天以上，建議就醫評估是否進行採檢及是否可繼續工作。

※前述處置建議，請參見「陸、醫療照護工作人員接種 COVID-19 疫苗後出現不良反應之處置流程」及附錄之「醫療照護工作人員接種 COVID-19 疫苗後出現不良反應之處置建議（範例）」。

## 伍、其他注意事項

一、因為目前接種 COVID-19 疫苗後尚無法完全預防 SARS-CoV-2 之感染及其傳播，故接種 COVID-19 疫苗之醫療照護工作人員仍應遵循現行相關感染管制措施之指引與防疫建議，以保護自己和他人免受 SARS-CoV-2 感染。


二、考量照護對象包含重症高危險群，且提供照護過程無法避免密切接觸，故完成 COVID-19 疫苗接種之醫療照護工作人員，若有 SARS-CoV-2 暴露風險，仍須遵循防疫措施。

三、接種疫苗不會影響 COVID-19 核酸或抗原檢驗的結果；因此若接種 COVID-19 疫苗後出現不良反應，經採檢進行核酸或抗原檢驗結果為 SARS-CoV-2 陽性時，不應歸因於 COVID-19 疫苗。

四、由於國外於接種 AstraZeneca 疫苗後出現罕見的血栓合併血小板低下之不良事件，若於接種疫苗後 28 天內出現栓塞相關的症狀時應立即就醫，即使是在接種疫苗 3 天以後出現相關症狀時，包含呼吸困難、胸痛、腿部腫脹、持續腹痛、神經學症狀（包含嚴重和持續性頭痛、視力模糊等）、非注射部位出現不尋常出血點等症狀。

五、更多 COVID-19 疫苗接種相關資訊，請參考衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19 疫苗」專區。

## 陸、醫療照護工作人員接種 COVID-19 疫苗後出現不良反應之處置流程




## 參考文獻

1. Centers for Disease Control and Prevention. Post Vaccine Considerations for Healthcare Personnel, updated Dec. 13, 2020.  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/post-vaccine-considerations-healthcare-personnel.html>
2. World Health Organization. Background document on the AZD1222 vaccine against COVID-19 developed by Oxford University and AstraZeneca, Mar. 1, 2021. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/339882>
3. World Health Organization. Background document on the mRNA vaccine BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) against COVID-19, Jan. 14, 2021.  
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/338671>
4. World Health Organization. Background document on the mRNA-1273 vaccine (Moderna) against COVID-19, Feb. 3, 2021.  
[https://www.who.int/publications/i/item/background-document-on-the-mrna-1273-vaccine-\(moderna\)-against-covid-19](https://www.who.int/publications/i/item/background-document-on-the-mrna-1273-vaccine-(moderna)-against-covid-19)
5. European Medicines Agency. AstraZeneca's COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets. <https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood>

## 附錄

# 疫苗接種前14天內曾有SARS-CoV-2暴露風險之醫療照護工作人員 接種CO VID-19疫苗後出現不良反應之處置建議（範例）

依出現的 症狀、發 生的時間 與持續情 形評估	症狀類別														症狀	
	與COVID-19感染無關之接種疫苗後症狀															
	疑似血栓合併血小板低下之症狀															
	與COVID-19感染及疫苗接種有關之症狀															
與COVID-19感染有關但與疫苗接種無關之症狀															咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常、腹瀉等	
情境															建議	
 <p>接種於第1天開始出現<b>蕁麻疹</b>2天</p>															個案無其他任何與COVID-19感染有關之症狀 依 <b>疫苗不良反應因應原則</b> 處理	
 <p>接種於第13天開始出現<b>疑似血栓合併血小板低下</b>之症狀</p>															個案無發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等COVID-19疑似症狀 建議 <b>就醫評估是否進行採檢及是否可繼續工作</b>	
 <p>接種於第1天開始出現<b>頭痛</b>3天</p>															暫停工作， <b>就醫評估採檢</b>	
 <p>接種於第1天開始出現<b>發燒</b>2天</p>															暫停工作， <b>就醫評估採檢</b>	
 <p>接種於第1天開始出現<b>發燒</b>3天</p>															暫停工作， <b>就醫評估採檢</b>	
 <p>接種於第3天開始出現<b>發燒</b>2天</p>															暫停工作， <b>就醫評估採檢</b>	
 <p>接種於第1天開始出現<b>咳嗽</b>2天</p>															暫停工作， <b>就醫評估採檢</b>	

# 疫苗接種前14天內無SARS-CoV-2暴露風險之醫療照護工作人員 接種COVID-19疫苗後出現不良反應之處置建議（範例）

依出現的 症狀、發 生的時間 與持續情 形評估	症狀類別	症狀
	與COVID-19感染無關之接種疫苗後症狀	蕁麻疹或嚴重過敏等立即性過敏反應、注射部位紅腫痛等
	疑似血栓合併血小板低下之症狀	呼吸困難、胸痛、腿部腫脹、持續腹痛、神經學症狀（包含嚴重和持續性頭痛、視力模糊等）、非注射部位出現不尋常出血點等
	與COVID-19感染及疫苗接種有關之症狀	發燒、頭痛、疲倦、肌肉痛、關節痛等
與COVID-19感染有關但與疫苗接種無關之症狀		咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常、腹瀉等
情境		建議
<p>於第1天開始出現 <b>蕁麻疹</b> 2天</p> <p>於第13天開始出現 <b>疑似血栓合併血小板低下</b> 之症狀</p>		<p>個案無其他任何與COVID-19感染有關之症狀 <b>依疫苗不良反應因應原則</b>處理</p>
<p>於第1天開始出現 <b>頭痛</b> 2天</p> <p>於第3天開始出現 <b>頭痛</b> 3天</p> <p>於第3天開始出現 <b>頭痛</b> 2天</p>		<p><b>仍可工作，可視情況考慮就醫評估</b>是否進行採檢</p> <p>建議<b>就醫評估</b>是否進行採檢及是否可繼續工作</p>
<p>於第1天開始出現 <b>發燒</b> 2天</p> <p>於第1天開始出現 <b>發燒</b> 3天</p> <p>於第3天開始出現 <b>發燒</b> 2天</p>		<p><b>原則上無須採檢</b>，於退燒24小時且相關症狀緩解後可返回醫院上班；<b>可視情況考慮就醫評估</b>是否進行採檢</p>
<p>於第1天開始出現 <b>咳嗽</b> 2天</p>		<p><b>暫停工作，就醫評估採檢</b></p>