



8. 孕婦及哺乳婦女

[全部收合](#)

Q8.1 孕婦可否接種COVID-19疫苗?



考量孕婦為COVID-19感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡之族群，為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種COVID-19疫苗。

最後更新日期 2021/11/22

Q8.2 懷孕期間什麼時候接種COVID-19疫苗比較恰當?



英美目前建議懷孕期間任何階段均可接種，孕婦可與醫師就個人孕期狀況、接種風險效益評估後，選擇合適接種的COVID-19疫苗。

最後更新日期 2021/11/22

Q8.3 施打Covid-19疫苗後需要避孕嗎?



不需要。目前沒有臨床試驗證據證明 COVID-19疫苗對生育能力及懷孕有不良之影響。

最後更新日期 2022/1/24

Q8.4 孕婦適合接種何種COVID-19疫苗?



無論孕婦接種輝瑞BNT、莫德納Moderna和AZ Covid-19疫苗目前皆無證據顯示會增加胎兒先天畸形、流產、胎死腹中、早產或懷孕併發症發生的風險。但專家建議孕婦可優先考慮 mRNA 疫苗，因其增加血栓機率更小，且較多安全性資料，也以同廠牌疫苗完成第二劑接種。

最後更新日期 2022/1/24

Q8.5 孕婦注射COVID-19疫苗後的可能副作用及需要特別注意哪些事?



接種疫苗後注射部位和全身性事件（副作用）很常見，例如：注射部位疼痛、發燒、肌肉疼痛、關節疼痛、頭痛、疲勞和其他症狀。另有如血栓併血小板低下症候群 (TTS)、心肌炎、死亡等嚴重但罕見之副作用，發生率約十萬分之一到二。孕婦接種疫苗後若出現陰道出血、懷疑破水、規則宮縮、持續下腹疼痛或自覺胎動減少的情形，應儘快前往醫院進行檢查。(台灣婦產科學會)

最後更新日期 2022/1/24

Q8.6 孕婦需要打COVID-19第二劑疫苗嗎? 需間隔多久打第二劑疫苗? ^

我國現有COVID-19疫苗都需要兩劑才能達到完整保護效果。目前建議施打間隔: AZ為8週，Moderna、BNT及高端為4週。

最後更新日期 2021/12/8

Q8.7 打完第一劑AZ Covid-19疫苗後懷孕，請問第二劑可以改打mRNA COVID-19疫苗嗎? ^

1. 國內外較少針對孕婦做COVID-19疫苗混打的臨床試驗，依據其他疫苗交替使用之臨床試驗初步結果，第一劑接種AZ Covid-19疫苗，第二劑接種mRNA Covid-19疫苗，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌高。故第二劑疫苗建議與第一劑疫苗同廠牌，以降低副作用可能對母體或胎兒造成影響。但如經醫師評估有必要更換廠牌接種，第2劑可以考慮改用 mRNA 疫苗。
2. 另如第一劑接種mRNA Covid-19疫苗後產生不良反應，可在醫師評估後第二劑改以不同製程的Covid-19疫苗完成接種。後續疫苗可經醫師參酌國內外已完成及進行中的實證研究結果、評估民眾健康狀況及感染風險等決定後續第二劑接種之適宜方案，亦可延後或不再接再種第二劑疫苗。

最後更新日期 2021/11/22

Q8.8 孕婦打了COVID-19疫苗還可以打流感疫苗嗎? ^

可以。COVID-19疫苗可與其他疫苗可同時分開不同手臂接種，亦可間隔任何時間接種，以利接種後反應之判別。

最後更新日期 2022/10/11

Q8.9 孕婦可以打COVID-19疫苗追加劑嗎? ^

可以。為因應COVID-19變異株於各國迅速傳播，和對於國內防疫造成之威脅，並確保醫療及防疫量能及保護高風險族群如孕婦之健康，台灣參考各先進國之作法及婦產科醫學會之建議，自111年1月7日起提供已完整接種COVID-19疫苗且滿3個月之民眾包括孕婦，追加接種第三劑COVID-19疫苗。

最後更新日期 2022/1/24

Q8.10 哺乳中可以打COVID-19疫苗嗎?

可以。目前對哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險。接種COVID-19疫苗後，仍可持續哺乳。母親接種疫苗後產生的抗體會出現在母乳中，可能對新生兒有保護效果，打完後也可以繼續哺乳。

最後更新日期 2021/11/22

Q8.11 孕婦可以接種莫德納次世代雙價疫苗嗎?

New ^

可以。目前已開放12歲以上民眾，可與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑間隔至少12週，接種莫德納次世代雙價疫苗作為追加劑，其中亦包含孕婦及哺乳婦女。

最後更新日期 2022/11/1