





疫苗種類/ 瓶身外觀	Moderna COVID-19疫苗 濃度0.1 mg/mL 	Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 幼兒劑型 	Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 兒童劑型 
對象* 及劑量	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 滿6個月至5歲： • 每劑抽取 0.25 mL • 每劑疫苗含量 25 mcg mRNA</li> <li>◆ 滿6歲至11歲： • 每劑抽取 0.5 mL • 每劑疫苗含量 50 mcg mRNA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 滿6個月至4歲： 0.9%無菌生理食鹽水注射液使用2.2 mL進行稀釋</li> <li>• 稀釋後每劑抽取 0.2 mL</li> <li>• 每劑疫苗含量 3 mcg mRNA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 滿5歲至11歲： 0.9%無菌生理食鹽水注射液使用1.3 mL進行稀釋</li> <li>• 稀釋後每劑抽取 0.2 mL</li> <li>• 每劑疫苗含量 10 mcg mRNA</li> </ul>
接種劑次 間隔	基礎劑2劑 (間隔4-8週以上)	基礎劑3劑 (第2劑與第1劑間隔至少 4 週， 第3劑與第2劑間隔至少 8週)	基礎劑2劑 (間隔4-8週以上)  基礎加強劑 (8大類對象，與第2劑間隔至少28天)  追加劑 (與前一劑次間隔至少84天)
(年齡 範例*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 滿6個月 112年1月3日接種，須為111年7月3日(含)以前出生</li> <li>➢ 滿6歲-106年(含)以前出生 112年1月3日接種，須為106年1月3日(含)以前出生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 滿6個月 112年1月3日接種，須為111年7月3日(含)以前出生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 滿5歲-107年(含)以前出生 112年1月3日接種，須為107年1月3日(含)以前出生</li> </ul>

\*註：核對出生年月日足歲

疫苗種類/ 瓶身外觀	 <p>BioNTech COVID-19疫苗 成人劑型</p>	 <p>Novavax COVID-19疫苗</p>	 <p>Moderna COVID-19疫苗 雙價BA.1</p>	 <p>Moderna COVID-19疫苗 雙價BA.4/5</p>
對象* 及劑量	<p>◆ 滿12歲以上：</p> <p>0.9%無菌生理食鹽水注射液使用1.8 mL進行稀釋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稀釋後每劑抽取 0.3 mL</li> <li>• 每劑疫苗含量 30 mcg mRNA</li> </ul>	<p>◆ 滿12歲以上：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每劑抽取0.5 mL</li> <li>• 每劑疫苗含量 5 mcg SARS-CoV-2 spike protein</li> </ul>	<p>◆ 滿12歲以上：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每劑抽取 0.5 mL</li> <li>• 每劑疫苗含量50 mcg mRNA</li> </ul>	<p>◆ 滿6歲至11歲：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每劑抽取 0.25 mL</li> <li>• 每劑疫苗含量25 mcg mRNA</li> </ul> <p>◆ 滿12歲以上：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每劑抽取 0.5 mL</li> <li>• 每劑疫苗含量50 mcg mRNA</li> </ul>
接種劑次 間隔	<p>基礎劑2劑 滿12歲至17歲(間隔12週) 滿18歲以上(間隔4週)</p> <p>基礎加強劑 (8大類對象，與第2劑間隔至少28天)</p> <p>追加劑 (與前一劑次間隔至少84天)</p>	<p>基礎劑2劑(間隔4週)</p> <p>基礎加強劑(僅適用18歲以上) (8大類對象，與第2劑間隔至少28天)</p> <p>追加劑 (與前一劑次間隔至少84天)</p>	<p>追加劑 (與前一劑次間隔至少84天)</p>	<p>追加劑 (與前一劑次間隔至少84天)</p>
(年齡範例*)	<p>➢ 滿12歲-100年(含)以前出生 112年1月3日接種，須為100年1月3日(含)以前出生</p>	<p>➢ 滿12歲-100年(含)以前出生 112年1月3日接種，須為100年1月3日(含)以前出生</p>	<p>➢ 滿12歲-100年(含)以前出生 112年1月3日接種，須為100年1月3日(含)以前出生</p>	<p>➢ 滿6歲-106年(含)以前出生 112年1月3日接種，須為106年1月3日(含)以前出生</p>

\*註：核對出生年月日足歲

# COVID-19疫苗接種作業<sup>3</sup>

## ➤ 依我國ACIP建議各劑次跨年齡接種COVID-19疫苗之接種建議

□ 接種間隔：依前一劑次接種時年齡之接種間隔

□ 接種劑量及廠牌：依該劑次接種時年齡之核准廠牌及接種劑量

劑次	第1劑	第2劑
例1 年齡	11y11m	滿12y
廠牌	BNT-1	BNT-2
劑型劑量	兒童劑型 0.2 ml	成人劑型 0.3 ml
接種間隔		與第1劑間隔4~8週 (依5~11歲接種間隔)

劑次	第1劑	第2劑
例2 年齡	17y11m	滿18y
廠牌	BNT-1	BNT-2
劑型劑量	成人劑型 0.3 ml	成人劑型 0.3 ml
接種間隔		與第1劑間隔至少12週 (依12~17歲接種間隔)