

彰化縣衛生局統計通報

中華民國 112 年 09 月會計室發布

網址：<https://www.chshb.gov.tw/taxonomy/term/180>

彰化縣嬰幼兒卡介苗注射概況

結核病是感染結核桿菌所引起的疾病，人體任何部位或器官都有可能發生感染，如肺、腦膜、淋巴腺、骨骼、腸、泌尿及生殖器官等，不過有 9 成的感染於肺部，最常出現的結核病為「肺結核」；也因為感染在肺部的關係，容易透過飛沫傳染。早期的肺結核病人早期並無明顯症狀，也不會產生不舒服的現象而延誤治療的時間，出現咳嗽、咳血、體重減輕、夜間盜汗、長期發燒、食慾不振、咳痰等症狀，已是中度或重度肺結核。

自 54 年起採行全面施打卡介苗政策，將適合接種年齡訂為出生 24 小時後及早接種；105 年 1 月 1 日起，調整為出生滿 5 個月，建議接種時間為出生滿 5-8 個月，至遲 1 歲前完成。卡介苗是一種牛的分枝桿菌所製成的活性疫苗，經減毒弱化，不會導致健康人群感染結核病，可產生對結核病的抵抗力，主要可避免造成結核性腦膜炎等嚴重併發症。

一、近年本縣嬰幼兒卡介苗接種率概況：

近年本縣嬰幼兒接種率皆約 99%，107 年接種率最低 98.63%，109 年接種率到高峰 99.44%，次年開始些許下降 111 年為 98.9%。




圖 1 彰化縣嬰幼兒卡介苗接種率

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)

二、111 年彰化縣嬰幼兒卡介苗接種概況：

彰化縣：111 年本縣共接種 9,887 位嬰幼兒，其中北彰化 4,833 人最多；本縣平均接種率為 98.90%，南彰化接種率最高 98.97%。

- (一) 北彰化：111 年北彰化共接種 4,833 位嬰幼兒。平均接種率為 98.83%；伸港鄉接種率達 99.46%；鹿港鎮接種率最低 98.28%，且低於本縣平均接種率。
- (二) 南彰化：111 年南彰化共接種 4,337 位嬰幼兒。平均接種率為 98.97%；二水鄉及永靖鄉接種率達 100%；埔心鄉接種率最低 98.03%，且為本縣接種率最低之鄉鎮。
- (三) 西南地區：111 年西南地區共接種 717 位嬰幼兒。平均接種率為 98.90%；竹塘鄉接種率達 99.10%；芳苑鄉接種率最低 98.54%，




圖 2 111 年彰化縣嬰幼兒卡介苗接種數(以三大生活圈區分)

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)

表一、111 年彰化縣各鄉鎮嬰幼兒卡介苗接種概況

生活圈與鄉鎮市		接種率 (%)	生活圈與鄉鎮市		接種率 (%)	生活圈與鄉鎮市		接種率 (%)
北彰化	小計	98.83	南彰化	小計	98.97	西南地區	小計	98.90
	彰化市	98.65		員林鎮	99.12		芳苑鄉	98.54
	鹿港鎮	98.28		溪湖鎮	99.10		大城鄉	98.72
	和美鎮	99.30		田中鎮	98.49		竹塘鄉	99.10
	線西鄉	98.53		大村鄉	98.60		二林鎮	99.09
	伸港鄉	99.46		埔鹽鄉	98.88			
	福興鄉	99.13		埔心鄉	98.03			
	秀水鄉	99.12		永靖鄉	100			
	花壇鄉	98.85		社頭鄉	99.09			
	芬園鄉	98.80		二水鄉	100			
		北斗鎮	98.82					
		溪州鄉	98.78					
		田尾鄉	99.50					
		埤頭鄉	98.81					

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)